In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use. Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.





PAROI ABDOMINALE

MUSCLES DE LA PAROI ANTERO-LATERALE DE L'ABDOMEN

Généralités :

Sur: www.la-faculte.net

Limites de la paroi abdominale:

en haut processus xiphoïde et 7° cartilage costal latéralement le rebord chondro-costal en bas par la crête iliaque, le ligament inguinal et le pubis

Essentiellement musculo-aponévrotique

Rapport intime avec les viscères intra-abdominaux

Intérêt: inspection percussion palpation

Voie d'abord principale des viscères abdomino-pelviens

MUSCLES DE LA PAROI ANTERO-LATERALE DE L'ABDOMEN

MUSCLES LATERAUX DE L'ABDOMEN (de la superficie à la profondeur)

Oblique externe

Oblique interne

Transverse

MUSCLES ANTERIEURS DE L'ABDOMEN (un seul plan)

Droits de l'abdomen

Pyramidal (inconstant)



Vue latérale

Transverse Horizontalement d'arrière en avant Oblique interne Oblique en avant et en haut


Oblique externe Oblique en avant et en bas


Obliquité différente --- sangle musculaire à fibres entrecroisées


Insertion: rebord chondro-costal Crête iliaque Arcs costaux
Crête iliaque


Terminaison: Gaine des droits (rectusienne)


















Oblique externe



Gaine rectusienne

PAROI ANTERO-LATERALE DE L'ABDOMEN

Oblique externe Oblique interne




Gaine rectusienne

26/02/2017

PAROI ANTERO-LATERALE DE L'ABDOMEN

Oblique externe
Oblique interne
Transverse



Gaine rectusienne

POINTS FAIBLES DE LA PAROI ANTERO-LATERALE DE L'ABDOMEN

Anneau ombilical Anneau inguinal Anneau fémoral Ligne de spigel

INNERVATION

Oblique externe: nerfs intercostaux 6 à 11 et le nerf subcostal

Oblique interne :10 et 11 nerfs intercostaux, le nerf subcostal et le nerf ilio-inguinal

Transverse :nerfs intercostaux 7 à 11, le nerf subcostal et les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal

Grands droits : nerfs intercostaux 6 à 11 et le nerf subcostal

Pyramidal: nerf subcostal

Physiologie

Oblique externe: rotateur controlatéral (fléchisseur antérieur du tronc)

(contraction des piliers rétrécit l'anneau inguinal superficiel)

Oblique interne : rotateur homolatéral (fléchisseur latéral du tronc)

(contraction de la faux inguinale rétrécit le canal inguinal)

Transverse : expirateur en attirant les côtes en dedans

Grands droits : fléchisseur antérieur du tronc

point fixe pubis rapproche thorax du bassin

point fixe thorax rapproche le pelvis du thorax

Pyramidal: tenseur de la ligne blanche

CANAL INGUINAL

CANAL INGUINAL: Généralités

Région inguinale:

Elle est située au dessus du ligament inguinal

Elle est traversée par le cordon spermatique chez l'homme et par le ligament rond de l'utérus chez la femme

Elle constitue une région de faiblesse de la paroi abdominale antérieure

Elle représente le siège le plus fréquent des hernies de l'abdomen 97% des hernies chez l'homme 50% des hernies chez la femme

Hiatus musculo-péctinéal:

C'est un carrefour abdomino-fémoral et abdomino-génital dont les passages, le canal inguinal et l'anneau fémoral, sont cernés par des formations ligamentaires communes.

Chaque passage peut-être le siège de hernies séparées par le ligament inguinal

CANAL INGUINAL: Généralités

Canal oblique de 3 à 5 cm de long

Situé au-dessus du ligament inguinal

Projection moitié médiale d'une ligne tendue du tubercule pubien à 1 cm environ en dedans de l'EIAS

Présente deux orifices: les anneaux inguinaux superficiel et profond

Présente 4 parois: antérieure

postérieure supérieure inférieure

